

JA庄内みどり

令和 3 年度 ねぎ-薬剤防除実績

1 頁(*)

事業所コード*	生産者番号(*)	生産者名	電話番号	圃場名・面積	播種日	定植日	収穫終了日
					月 日	月 日	月 日

履歴番号(*)	履歴名	品種名	収穫開始日(*)	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日
522	赤ねぎ		出荷検査に該当の日付を左から順番に記入	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

濃度が計画通りの時は 該当する農薬の防除実施日を記入してください。

農薬登録番号 または 屋号抜き農薬番号	【種類名】 農薬名	【本剤使用回数】	希釈倍数 使用量	濃度(倍、シハレリはppm)		1 回目		2 回目		3 回目		4 回目		5 回目		6 回目	
				印	実績	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
94759	殺菌剤 アフエツフロアブル	14日前 2回以内	さび病,黒斑病,黒腐菌核	1000~2000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
90785	殺菌剤 オリゼメート粒剤	30日前 2回以内	軟腐病	6kg/10a						X	X	X	X	X	X	X	X
92702	殺菌剤 カリグリーン	1日前 -回	うどんこ病,さび病,灰色か	800~1000倍													
98308	殺菌剤 クプロシールド	-回	べと病,軟腐病,斑点細菌	1000~2000倍													
93343	殺菌剤 ストロビーフロアブル	7日前 3回以内	さび病,黄斑病,黒斑病	2000倍								X	X	X	X	X	X
93268	殺菌剤 バイオキパー水和剤	-回	軟腐病	500~2000倍													
98424	殺菌剤 パレード20フロアブル	1日前 1回	さび病,黒斑病,黒腐菌核	100~4000倍				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98199	殺菌剤 メジャーフロアブル	1日前 3回以内	さび病,べと病,黒斑病,葉	2000倍								X	X	X	X	X	X
93349	殺菌剤 アフーム乳剤	7日前 3回以内	シロイモシヨウ,ハモクリハ 類	1000~2000倍								X	X	X	X	X	X
90949	殺菌剤 カルホス微粒剤F	1回	ネキム 類	6kg/10a				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93546	殺菌剤 スピノエース顆粒水和剤	3日前 3回以内	アサミダ類,シロイモシヨウ	2500~5000倍								X	X	X	X	X	X
93885	殺菌剤 ダントツ粒剤	3日前 4回以内	ネハエネキア,サシマネキハモ	3~6kg/10a										X	X	X	X
95445	殺菌剤 ディアナSC	1日前 2回以内	アサミダ類,シロイモシヨウ,ネ	2500~5000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
98423	殺菌剤 ファインセーフフロアブル	3日前 2回以内	アサミダ類,ネキハモクリハエ	1000~2000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
94538	殺菌剤 フェニックス顆粒水和剤	7日前 3回以内	シロイモシヨウ,ネキコガ	2000~4000倍								X	X	X	X	X	X
16																	
17																	
18																	

製作 提供 特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所

202

<p>連絡事項</p> <p>収穫予定日の7日前までに提出してください。 農薬はルールに従い正しく使用しましょう。</p>	<p>提出日： 年 月 日</p> <p>署名： 氏名 印</p>	<p>受付</p>	<p>確認 登録</p>	<p>確認</p>	<p>JA確認</p>	<p>JA確認</p>
--	-----------------------------------	-----------	--------------	-----------	-------------	-------------